

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 11-3-750

BULLETIN TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "NORD et PICARDIE"

(NORD - PAS-DE-CALAIS - SOMME - AISNE - OISE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX - B.P. 355 - 62005 ARRAS - Tél. : 21.04.21

ABONNEMENT ANNUEL

30 F

XXXXXX 50 F

Rég. recettes Dir. Dép. Agric.

13, Grand-Place - 62022 ARRAS

C. C. P. LILLE 5701-50

Bulletin N° 25 - 6 MARS 1975

La date limite pour le renouvellement des abonnements ayant été fixée au 28 FEVRIER 1975, nous prions instamment les Abonnés individuels ou collectifs de bien vouloir souscrire leur réabonnement dans les plus brefs délais afin d'éviter toute interruption dans l'envoi des bulletins.

OIDIUM DU POMMIER

ARBORICULTURE

Au cours de la dernière campagne, les conditions climatiques ayant été très favorables à l'évolution de l'Oïdium, les sources d'inoculum sont bien souvent très importantes.

Des contaminations précoces pourront se produire dès le stade C3 à partir des conidies formées dans les bourgeons infestés en 1974.

Profiter d'un traitement contre la Tavelure pour réaliser en même temps une intervention contre l'Oïdium au fur et à mesure que les variétés arriveront au stade sensible (C3-D).

TAVELURE DU POIRIER

L'évolution des arbres semble avoir été freinée au cours des 10 derniers jours par suite des basses températures.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les variétés "Conférence et Williams" sont au stade C3. Dans l'Aisne, la Somme et l'Oise, ces variétés ont atteint le stade D.

A Arras, nous avons enregistré les premières projections d'ascospores. Des contaminations importantes sont à prévoir à l'occasion des prochaines pluies si la température se radoucit.

En conséquence, pour toutes les variétés ayant atteint le stade C3-D, un traitement sera donc effectué.

TAVELURE DU POMMIER

Le développement de la végétation est homogène au niveau de la Circonscription.

Les variétés hâtives type "Boskoop" sont au stade C3-D et deviennent réceptives aux premières contaminations.

Un premier traitement sera donc effectué sur ces variétés.

Les variétés tardives, types "Golden" sont au stade B3 pour les vergers les plus au Sud et on attendra qu'elles atteignent le stade C3-D avant d'intervenir.

L'Ingénieur d'Agronomie et les
Ingénieurs chargés des Avertissements
Agricoles

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE